

Spezielle Literatur

ACHENBACH et al. (1993): Mindestbestand des Neuntöters (*Lanius collurio*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau im Jahr 1993. – *Collurio* 11: 48-52.

ACHENBACH, E.L. (1996): Markierte Vögel im NSG "Kühkopf-Knoblochsau" –*Collurio* 14: 111-15.

AVIFAUNISTISCHE AG HESSEN 1969: 1. Wanderführer Kühkopf-Knoblochsau. Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

BAUMGÄRTEL, R. (1996): Rehwildbejagung in einem Großnaturschutzgebiet. - *Allgemeine Forstzeitschrift* 16: 910-913.

BAUMGÄRTEL, R. (1997): Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau. -*Collurio* 15: 36-46.

BAUMGÄRTEL, R. (1999): Urzeitkrebse in der hessischen Rheinaue. – *Collurio* 17: 151-53.

BAUMGÄRTEL, R. & ZEHM, A. (1999): Zur Bedeutung von Fließgewässerdynamik für naturnahe Rheinufer unter besonderer Betrachtung der Schwarzpappel (*Populus nigra*) und Sandrasen. - *Natur und Landschaft* 12 : 530-535.

BAUMGÄRTEL, R. (2002): Informationszentrum Kühkopf-Knoblochsau. - *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* 6: 177-179.

BAUMGÄRTEL, R. (2002): Vom Kühkopfkuratorium bis zur modernen Besucherlenkung. - *50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau*, 23-25.

BAUMGÄRTEL, R. & GRÜNKLEE, W. (2002): Sukzession nach Dambruch auf ehemaligen Ackerflächen in der Rheinaue: Ergebnisse nach 17 Jahren ungestörter Sukzession auf der Rheininsel Kühkopf. - *Natur und Landschaft* 6/2002: 269-273.

BAUMGÄRTEL, R. (2003): Fundmeldungen. Neufunde - Bestätigungen - Verluste. Nr. 964-965. - *Botanik und Naturschutz in Hessen* 16: 58.

BAUMGÄRTEL, R. (2004): NSG-Kühkopf mit Informationszentrum im Internet, *Jahrbuch Naturschutz* 8: 183

BAUMGÄRTEL, R. (2004): *Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*, *Lindernia dubia*. *Botanik und Naturschutz in Hessen* – Fundmeldungen – Nr. 17. 2004:123

BAUMGÄRTEL, R. (2004): Zur aktuellen Situation der Hartholzauenwälder im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsau"; *Botanik und Naturschutz in Hessen* 17: 53 -63.

BAUMGÄRTEL, R. (2007): Initialisierung von Hartholzauwald am nördlichen Oberrhein unter besonderer Berücksichtigung der Stieleiche (*Quercus robur*) -*Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal* 2006:86-90.

BAUMGÄRTEL, R. (2007): Anlage von Auwald durch Umbau von Hybridpappelbeständen am nördlichen Oberrhein. *Forst und Holz*, März 2007:26-29.

BAUMGÄRTEL, R. (2008): Der Eschen-Ahorn (*Acer negundo*) am nördlichen Oberrhein. Beitrag zur naturschutzfachlichen Einschätzung eines Neophyten. *Botanik und Naturschutz in Hessen* 21, 5-9.

BAUMGÄRTEL, R. (2009): Besucherlenkungskonzepte in Naturschutzgebieten –einladen oder aussperren? – In Wolf/Appel-Kummer: *Naherholung in Stadt und Land*, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2009: 272-280.

BAUMGÄRTEL, R. (2009): *Salvinia natans*. *Botanik in Hessen* 22 – Fundmeldungen: S.166

BAUMGÄRTEL, R. & DONATH T. (2010): Exkursion 1: Die nördliche Oberrheinniederung - *Tuexenia*. Beiheft Nr. 3 zur Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft (FlorSoz) in Gießen 2010: 27 – 39.

BAUMGÄRTEL, R. (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste. Nr.1753–1767. *Botanik und Naturschutz in Hessen* 24: 107–111.

BAUMGÄRTEL, R. (2012): *Bromus arvensis* subsp. *arvensis* u.a. Fundmeldungen in *Botanik und Naturschutz in Hessen* 25: 93–94.

BAUMGÄRTEL, R. (2014): Schatzinsel Kühkopf. *Naturschutz in Hessen, Jahrbuch Band 15, 2013/2014*. S. 174-178

- BERCK, K. H. (1959): Beobachtung einer übersommernden Reiherente, einer Eiderente auf dem Kühkopf. - Lusc. 32, 29-30.
- BAUMGÄRTEL, R. & WESTPHAL, P. (2015): Umweltbildung – Warum lernen wir an Flüssen so gut? – Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 21 – 27
- BAUMGÄRTEL, R (2016): Floristische Kartierung Teilbereiche Kühkopf und Umgebung des Messtischblattes, <http://www.rp-da.de/arten/flora.htm>
- BERCK, K.H. (1962): Wintervorkommen des Rotmilans im Rheingebiet - Lusc. 35, 31-32.
- BERMAN, S. & BIANCHARD, R. (1996): The Social Design of Nature. A Focus on Kühkopf Island, Germany. An interactive qualifying project submitted to the faculty of Worcester Polytechnic Institute.
- BERNDT, A. (2008): Blaukehlchen in Rapsfeldern –Vom Feuchtgebietsspezialisten zum Ackerbrüter. Diplomarbeit des Institut für Landschaftsökologie der Wilhelms-Universität Münster.
- BISSELS S., HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Population structure of the threatened long-lived perennial *Serratula tinctoria* in relation to vegetation and management. -Applied Vegetation Science: 7.2: 267-274.
- BISSELS S., HÖLZEL N., DONATH T.W. & OTTE A. (2004): Evaluation of restoration success in alluvial grasslands under contrasting flooding regimes. -Biological Conservation: 118/5: 641-650.
- BISSELS S., DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2005): Ephemeral wetland vegetation of irregularly flooded arable fields: the importance of persistent soil seed banks. - Phytocoenologia 35: 469-488.
- BISSELS S. (2005): Restoration of alluvial grasslands: Effects of flooding and management on plant dispersal and recruitment. Doktorarbeit Universität Gießen
- BISSELS S., DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2006): Effects of different mowing regimes on seedling recruitment in alluvial grasslands. - Basic and Applied Ecology 7: 433-442.
- BÖGER, K. (1991): Grünlandvegetation im hessischen Ried, Pflanzensoziologische Verhältnisse und Naturkonzeption, gekürzte Fassung der Dissertation TH Darmstadt, Frankfurt a.M.: Schriftenreihe der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen.
- BOETTGER, C.R. (1907): C.R.: Zur Conchylienfauna des Kühkopf (Rheininsel). - Nachr. Bl. Dtsch. Malak. Ges. 48, 17-19, Frankfurt/M.
- BUNDESAMT FÜR DEN NATURSCHUTZ (1994): Technisches Handbuch. 3. Fassung FFH-Richtlinie, Anhänge I, II, IV und V (bearbeitet vom Institut für Biotopschutz und Landschaftsökologie) Bonn.
- BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ HESSEN (1998): Forstwirtschaft im Europareservat. - Naturschutz und Landschaftsplanung 30: 34-35.
- BURMEIER S., ECKSTEIN R.L., DONATH T.W. & OTTE A. 2008: Samenbankentwicklung und -dynamik in Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein. Treffpunkt Biologische Vielfalt 8: 133-138
- BURMEIER S., ECKSTEIN R.L., DONATH T.W. & OTTE A. 2011: Plant pattern development during post-restoration succession in grasslands – a case study of *Arabis nemorensis*. Restoration Ecology 19: 648-659
- CECANNE R. & EICHLER M. (2009): Flechtenkundliche Erhebungen im FFH-und Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsau“. Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt.
- CECANNE R. & EICHLER M. (2009): Flechtenkundliche Erhebungen im Naturwaldreservat „Karlswörth“ –Erstaufnahme. Gutachten im Auftrag der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt.
- DETTINGER-KLEMM, A.: Artenliste zur Amphibien- und Reptilienfauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- DISTER, E. & ZETTL, H. (1978): Kühkopf-Knoblochsau in Hillesheim-Kissel: Die Naturschutzgebiete Hessens. - Darmstadt: Institut für Naturschutz, Schriftenreihe XI,3
- DISTER, E. (1980): Geobotanische Untersuchungen in der Hessischen Rheinaue als Grundlage für die Naturschutzarbeit. - Dissertation Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Georg August-Uni Göttingen.
- DISTER, E. et.al (1987): Erfassung der tierischen und pflanzlichen Sukzession auf den aufgelassenen Ackerflächen des Kühkopf. - Rastatt: WWF-Aueninstitut, unveröffentlicht.

DIESTER, E. (2002): Der Kühkopf - ein Auen-Schutzgebiet von europäischer Bedeutung. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 5-10.

DIESTER, E., DIRINGER, G., OBRDLIK, H., BERNHART, H. & KONTUSCH, L. (2003): Vorstudie für die Sanierung des Neurheinufers im Bereich des Naturschutzgebietes „Kühkopf-Knoblochsau“: 28 pp. + Karten; Rastatt.

DONATH T. W. & HÖLZEL, N. (2001): The impact of site conditions and dispersal on restoration success. -Verh. Ges. f. Ökol. 31:212.

DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2003): The impact of site conditions and seed dispersal on restoration success in alluvial meadows. - Applied Vegetation Science 6.1: 13-22.

DONATH T.W., HÖLZEL N., BISSELS S., & OTTE A. (2004): Perspectives for incorporating biomass from non-intensively managed temperate flood meadows into farming systems. - Agriculture, Ecosystems & Environment: 104: 439-451.

DONATH T.W. (2005): Restoration of flood meadows - the importance of seedbanks, dispersal, recruitment and agricultural management. Doktorarbeit Universität Gießen

DONATH T.W., BISSELS S., HANDKE K., HARNISCH M., HÖLZEL N. & OTTE A. (2006): E + E-Vorhaben "Stromtalwiesen"- Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung. - Natur und Landschaft 11: 529-535

DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2006): Influence of competition by sown grass, disturbance and litter on recruitment of rare flood-meadow species. Biological Conservation 130: 315-323.

DONATH, T. et al. (2006): E + E-Vorhaben „Stromtalwiesen“, Renaturierung von Stromtalwiesen am Hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung -Natur und Landschaft 11/2006, 529-536.

DONATH T.W., BISSELS S., HÖLZEL N. & OTTE A. (2007): Large scale application of diaspore transfer with plant material in restoration practice - impact of seed and microsite limitation. - Biological Conservation 138: 224-234.

DONATH T.W. & ECKSTEIN R.L. 2008: Die Bedeutung genetischer Faktoren für die Wiederansiedlung seltener Pflanzengemeinschaften. Naturschutz und Landschaftsplanung 40: 21-25.

DONATH T.W., SCHMIEDE R., HARNISCH M., BURMEIER S., ECKSTEIN R.L. & OTTE A. 2009: Renaturierung von Auenwiesen - Perspektiven für die langfristige Entwicklung. ANL Laufener Spezialbeiträge 2/09: 122-132

DONATH, T. & BAUMGÄRTEL, R. (2010): Exkursion 1: Die nördliche Oberrheinniederung.
- In Otte, A et al.(2010): Exkursionsführer zur Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Gießen 2010: 27–42

ECKSTEIN, R. L., DANIHELKA, J., HÖLZEL, N. & OTTE, A. (2004): The effects of management and environmental variation on population stage structure in three river-corridor violets. - Acta Oecologica 25: 83-91.

ECKSTEIN R.L. & DONATH T.W. (2005): Interactions between litter and water availability affect seedling emergence in four familial pairs of floodplain species. - Journal of Ecology 93: 807-816.

EG-VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung wildlebender Vogelarten (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, Reihe L 103: 1-6).

ERNST, M. (2000): Die Entstehung von Sukzessionsgrünland auf dem Kühkopf aus der Sicht der Pflegeplanung. – Collurio 18: 150-160.

ERNST, M. (2002): Kühkopf-Knoblochsau: Ein Schutzgebiet von internationaler Bedeutung. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 21-23.

ERNST, M. (2007): Die Schmetterlingsfauna des NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. Collurio Nr. 25 (2007), 161–180.

ERNST, M. (2008): Verbreitung der Haarstrangwurzeule (Gortyna borelii Pierret 1837) in Hessen. Vorschlag eines Bewertungsschemas für den Erhaltungszustand von Populationen. Naturschutz und Landschaftsplanung. Zeitschrift für angewandte Ökologie, 37, H. 12: 376-383.

ERNST, M. (2008): Die Schmetterlingsfauna des NSG und FFH-Gebietes "Kühkopf-Knoblochsau" unter besonderer Würdigung auentypischer Arten. Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Band 12, S. 55-74, Zierenberg.

ETZEL, F. (1999): Dendroökologische und dendroklimatologische Informationen aus Eichen in Südhessen/NSG Kühkopf-Knoblochsau. -Diplomarbeit Fachbereich 18, Geographie, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main.

- FAUST, B. (1965): Beobachtungen seltener Limikolen in Hessen. - Lusc. 38/2: 108.
- FEIST, O. (1962): Beutelmeise erneut auf dem Kühkopf beobachtet. - Orn. Mitt. 1/62: 17.
- FEIST, O. (1963): Beobachtungen über Wirtsvögel des Kuckucks bei Erfelden. - Lusc. 36, 72-74.
- FLÖSSER, E. (1987): Die Anthropoden der Pionierphase der Primärsukzession auf neu entstandenen Sandflächen der Rheinaue (Kühkopf, Hessen). Diplomarbeit im Fach Biologie der Uni Frankfurt.
- FRIEMANN, H. (1964): Beobachtung auf der Rheininsel Kühkopf. Jahresber. d.O.A.O. 2.: 23–26.
- FRIEMANN, H. & STRAUBE (1967): Schwarzstörche auf dem Kühkopf. -Lusc. 40(1): 16.
- FRIEMANN (2002): Internationale Wasservogelzählungen am Kühkopf. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 56-60.
- FRITZSCHE, W. (2003): Die Schwedensäule bei Erfelden. - Denkmalpflege & Kulturgeschichte 1/2003; 36 -41.
- FRITZ, H.G., HEIMER, W. 1981: Stechmückenbrutplätze im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. Untersuchungen zur Begleitfauna, Möglichkeiten einer Minderung der Stechmückenplage. Natur und Landschaft 56:80-84.
- GANSE, P. (1965): Maibeobachtung des Kranichs vom Kühkopf. - Lusc. 38(2): 107.
- GERDES, S. (2008): Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein –eine GIS-basierte Analyse. Diplomarbeit, Institut für Landschaftspflege der Wilhelms-Universität Münster.
- GIERSBERG, H. (1971): Vom Tierleben des Kühkopfes und der Knoblochsau. - In Pfeifer (1972): 38-58.
- GOCHT, T. (1999): Tiefenverteilung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) und Schwermetallen an semiterrestrischen Sedimenten der Rheinaue (Hessisches Ried). Diplomarbeit am Fachbereich Geographie der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 1-139.
- GONNERMANN, H. (2002): Die Wälder des Naturschutzgebietes - Von der Pappelwirtschaft zum Prozessschutz.- 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 29-44.
- GREGOR T., KÖNIG A., KORTE., MIKA M. & MÜLLER C. 2012: Gewässermakrophyten in Gräben der Oberrhein- und Untermainebene. Botanik und Naturschutz in Hessen 25:15-31
- GROH, K.: Artenliste zur Molluscenfauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf -Knoblochsau.
- GROßE-BRAUCKMANN, H. (1994): Holzersetzende Pilze des Naturwaldresevats Karlsruh. - Mitteilung der Hessischen Landesforstverwaltung, Bd. 29.
- HAAS, F. 1922: Der Kühkopf ein Zeuge der Vergangenheit des Oberrheins. Berichte der Senckenbergischen Gesellschaft 1922:29-56.
- HAEDE (1961): Beobachtung eines Sterntauchers auf dem Kühkopf. - Lusc. 34: 18.
- HAEDE (1961): Seeadler hält sich mehrere Wochen auf dem Kühkopf auf. - Lusc. 34: 20.
- HANDKE, K. (1982): Ergebnisse einjähriger Brutvogeluntersuchungen in Hessens größtem Naturschutzgebiet NSG Kühkopf-Knoblochsau. -Luscinia 44(5/6).
- HANDKE K., OTTE A. & DONATH T.W. 2011: Alternierend spät gemähte Altgrasstreifen fördern die Wirbellosenfauna in Auenwiesen. Naturschutz und Landschaftsplanung 43: 280-288
- HARNISCH, M., OTTE, A., SCHMIEDE, R., & DONATH T.W. (2014): Verwendung von Mahdgut zur Renaturierung von Auengrünland. Ulmer Eugen Verlag ISBN 978-3-8001-6949-8.
- HARTMANN, G. (2002): Den Kühkopf zum Ausdruck bringen - Kunst im Naturschutzgebiet, 25-29.
- HARTUNG, J.(2017): Der Kühkopf Jagdgebiet des Hochadels. – Förderverein Hofgut Guntershausen e.V. Stockstadt am Rhein: 1-53
- HARZBECKER, E. (1968): Beobachtungen im Naturschutzgebiet Kühkopf bei Erfelden. - Orn. Mitt. 6: 13.
- HEATH, M.F. & EVANS, M. I. (Hrsg.) (2000): Important Bird Areas in Europe. Priority sites for Conservation, Vol. 1: Northern Europe, Bird Life Conservation Series, Cambridge.

- HEBERER, A. (2020): Der Einfluss von Wildschweinaktivitäten auf den Renaturierungserfolg in Stromtalwiesen. Masterarbeit im Fachbereich Agrarwissenschaften, Ökotoxikologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen, 1-94.
- HEIMER, W. (1983): Auswirkungen von Wasserstandsschwankungen auf Diptera /Brachycera (Insekta) in Naturschutzgebieten der Hessischen Rheinaue. - Dissertation Fachbereich Biologie der TH Darmstadt.
- HELVENSEN, O. v. (1968): Eine Zwergschabe am Kühkopf. - Lusc. 40: 112.
- HEMMEN, J. (1972): Die Mollusken-Fauna der Rheininsel Kühkopf (Naturschutzgebiet). Staatsexamensarbeit Darmstadt (unveröffentl.)
- HEMMEN, J. (1973): Die Molluskenfauna der Rheininsel Kühkopf. -Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 102: 105-107, Wiesbaden.
- HENSGEN F., ALBRECHT C., DONATH T.W., OTTE A. & ECKSTEIN R.L. 2011: Distribution of gastropods in floodplain compartments and feeding preferences for river corridor plant species: is there an effect of gastropod herbivory on the distribution of river corridor plants? Flora 206: 534-543
- HERZIG, G. (1999): Die Fledermäuse im größten hessischen Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. -Collurio 17: 11-44.
- HERZIG, G. (2002): Die Fledermäuse im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 68-72.
- HERZIG, G.: Artenliste zur Fledermausfauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- HESSISCHES FORSTEINRICHTUNGSWERK (1999): Betriebsbuch, Forstamt Groß-Gerau, Forstbetrieb Staatswald, Betriebswerk V Kühkopf-Knoblochsau, Abteilung 318-437, 1999.
- HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN und NATURSCHUTZ (1995): Hess. Biotopkartierung (HB). Kartieranleitung. 3. Fassung. Wiesbaden (unveröffentl.).
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG,WOHNEN,LANDWIRTSCHAFT,FORSTEN- UND NATURSCHUTZ (1994): Richtlinie für die Durchführung des Hess. Landschaftspflegeprogramms (HELP). Staatsanzeiger für das Land Hessen 12/1994 S.916-919.
- HGON (Hrsg.) (1995): Naturschutz-Großprojekte der HGON; unter anderem Europareservat Kühkopf-Knoblochsau; Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, Echzell.
- HILLERICH, K. (1965): Junge Schwarzmilane mit missgebildeten Schwingen und Fängen. -Lusc. 38/1, 13-15.
- HILLERICH, KLAUS (1983): Die Situation der Greifvögel im Rhein-Main-Gebiet. - Vogel und Umwelt 2/1983.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U., KARAFIAT, H. & MARQUARDT, F. (1973): Kartierung des Zweiblättrigen Blausterns (*Scilla bifolia* L.) im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsau". - Hessische Floristische Briefe 22(3): 34-37.
- HODVINA S., CEZANNE R., HARNISCH M. & DONATH T.W. 2007: Die Wiesen-Schwertlilie (*Iris spuria*) in Hessen. Botanik und Naturschutz in Hessen 19: 69-97.
- HÖLZEL N., (1999): Flora und Vegetation der Auenwiesen im NSG "Lampertheimer Altrhein" -eine aktuelle Zustandsanalyse mit Hinweisen zur zukünftigen Pflege und Entwicklung. - Jahrbuch Naturschutz in Hessen 4: 24-42; Zierenberg.
- HÖLZEL N., (2000): Renaturierung von Stromtalwiesen durch Oberbodenabtrag und Mahdgutübertragung. - Verh. Ges. f. Ökol. 30: 114.
- HÖLZEL N., & OTTE A. (2001): The Impact of flooding-regime on the soil seed bank of flood-meadows. - Journal of Vegetation Science 12: 209-218.
- HÖLZEL N., DONATH T., BISSELS S. & OTTE A. (2002): Auengrünlandrenaturierung am hessischen Oberrhein - Defizite und Erfolge nach 15 Jahren Laufzeit. Schriftenreihe für Vegetationskunde 36: 131-137.
- HÖLZEL N. & HARNISCH M. (2002): Renaturierung von Stromtalwiesen. - Garten und Landschaft 112/8: 36-38.
- HÖLZEL N. (2003): Re-assessing the ecology of rare flood-meadows violets (*Viola elatior*, *V. pumila* and *V. persicifolia*) with large phytosociological data sets. Folia Geobotanica 38: 281-298.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2003): Restoration of a species-rich flood meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant material. - Applied Vegetation Science 6.2: 131-140.

- HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Inter-annual variation in the soil seed bank of flood-meadows over two years with different flooding-patterns. - *Plant Ecology*: 174: 279-291.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Ecological significance of germination characteristics in flood-meadow species. - *Flora* 199: 12-24.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Assessing soil seed bank persistence in flood-meadows: The search for reliable traits. - *Journal of Vegetation Science*: 15: 93-100.
- HÖLZEL, N. (2005): Seedling recruitment in flood-meadow species: The effects of gaps, litter and vegetation matrix. - *Applied Vegetation Science* 8:115-124.
- HÖLZEL N., BISSELS S., DONATH T.W., HANDKE K., HARNISCH M. & OTTE A. (2006): Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein - Ergebnisse eines E + E-Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz. - *Naturschutz und biologische Vielfalt* 31: 263.
- HÖLZEL, N. ET.AL. 2006: Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein. Bd. 31 Reihe: Naturschutz und Biologische Vielfalt des Bundesamtes für Naturschutz – Bonn- Bad Godesberg 2006:263.
- HÖLZEL, N.: Re-assessing the synecology of three rare violet species with large phytosociological datasets (eingereicht zur Veröffentlichung bei *Journal of Vegetation Science*).
- HÖLZEL, N.: Assessing the usefulness of C-S-R functional types in practical applications at the community level: two examples from Central European Grassland (eingereicht zur Veröffentlichung bei *Journal of Applied Ecology*).
- HÖLZEL, N. & OTTE, A.: Restoration of a species-rich flood meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant litter (eingereicht zur Veröffentlichung bei *Applied Vegetation Science*).
- HÖLZEL, N. et al.: Auengrünlandrenaturierung am hessischen Oberrhein - Defizite und Erfolge nach 15 Jahren Laufzeit, Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 36, 131-137, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
- JUNG L., DONATH, T., ECKSTEIN, L., OTTE, A. 2012: Regulierung der Herbst-Zeitlose (*Colchicum autumnale* L.) in extensiv genutztem Grünland. Endbericht DBU, 89 Seiten
- JUNG L.S., ECKSTEIN R.L., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Above- and below-ground nutrient and alkaloid dynamics in *Colchicum autumnale*: optimal mowing dates for population control or low hay toxicity. *Weed Research* 52: 348-357
- KAFFENBERGER, C. (2015): Denkmalpflege – Ein Akt der Nachhaltigkeit - *Denkmalpflege & Kulturgeschichte* in Hessen, 3-2015: 12 – 21
- KAISER, D.F. (2018): Ökologische Beurteilung des Flächennutzungswaldes am Hessischen Oberrhein zwischen 1829 und 2015 mit dem Schwerpunkt Auengrünland. – Hausarbeit des Fachbereiches Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen: 0-15
- KINZELBACH, R. und MARTENS, J. (1964): Die Beutelmeise am Oberrhein. - *J. Orn.* 2: 137-148.
- KLÄGE, H.C. (1992): Strategien zum Schutz von Ackerwildpflanzen- 10 Jahre Schutz von Ackerpflanzen in der nordwestlichen Niederlausitz. - *Biologische Studien* 21: 79-81
- KLUGE, W. 1982: Naturschutz, Erholung und Forstwirtschaft im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue. Diplomarbeit Forstwissenschaftliche Fakultät Freiburg im Juni 1982: 1-160.
- KÖNIG, A. (1983): Der Kreis Groß-Gerau als Lebensraum bestandsbedrohter Vogelarten, Deutscher Bund für Vogelschutz, Kreisverband Groß-Gerau.
- KONRAD, A. (2018): Die Entwicklung der Ufer des Kühkopfs von 1829 bis 2015. – Projektarbeit des Fachbereiches Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement: 0-21
- KORTE, E. (1999): Bestandsentwicklung der Fischarten der hessischen Rheiaue 1994-1997; Dissertation Uni Marburg; Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 268, Hess. Landesanstalt für Umweltschutz.
- KORTE, E. (2002): Die Fischfauna im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue, 64-68.
- KORTE, E.: Artenliste zur Fischfauna von Kühkopf-Knoblochsaue, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsaue.
- KORTE, E. & GREGOR, T. (2008): Neue Characeenfunde aus Hessen. *Rostocker Meeresbiologische Beiträge* Heft 19:7-12.

KORTE, E. (2009): *Groenlandia densa*, *Nymphoides peltata*, *Potamogeton angustifolius*, *Potamogeton gramineus*, *Trapa natans*. *Botanik in Hessen* 22: 187-188.

KORTE, E, GREGOR, T & KÖNIG, A (2009): Aquatische Makrophyten in hessischen Stillgewässern. *Botanik in Hessen* 22: 11-46.

KORTE, E., GREGOR T., Heigl, E., KÖNIG A. (2009): Erfassung der Gewässermakrophyten in Hessen. Untersuchung der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Land Hessen.

KOSEL, D. (2000): Beziehung zwischen Geotopen und Biotopen und ihre Aussagefähigkeit im Rheinland auf das Entwicklungspotenzial von Naturschutzgebieten. Diplomarbeit Uni Frankfurt Main. (Bsp. Kühkopf).

KNÜVER, A. (2010): Molekulargenetische Charakterisierung einer natürlich regenerierten Schwarzpappelpopulation auf einem Pionierstandort im Naturschutzgebiet Kühkopf (Oberrhein). Wissenschaftliche Hausarbeit Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Biologie: 70

KRETTEK, R. (2000): Zum Nahrungsspektrum hessischer Kormorane. - *Vogel und Umwelt* 11(1-2): 67-74.

KREUZIGER, J. & E.L. ACHENBACH (1998) Graureiher (*Ardea cinerea*) verschlingt Küken des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*). - *Vogelwarte* 39: 301-302.

KREUZIGER, J. & T. LANGENBERG (2000): Erste Überwinterung eines Eistauchers (*Gavia immer*) in Hessen. - *Luscinia* 56: XXX.

KREUZIGER, J. & ZETTL, H. (1998): Die Auswirkung von Sukzessionsprozessen auf die Bestandentwicklung des Goldammers (*Emberiza citrinella*). - *Collurio* 16: 56-63.

KREUZIGER, J. (1994): Die Vogelgemeinschaft einer Hartholzaue im NSG "Kühkopf.Knoblochsae". Ein Vergleich nach 15 Jahren. - *Collurio* 12: 9-38.

KREUZIGER, J. (1995): Hohe Siedlungsdichte der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im NSG „Kühkopf Knoblochsae“. - *Collurio* 13: 5-66.

KREUZIGER, J. (1996): Die Bedeutung der Rheinauen für den Pirol (*Oriolus oriolus*). - *Collurio* 14: 42-46.

KREUZIGER, J. (1997): Die Bedeutung von Sukzessions- und Renaturierungsprozessen für die Vogelgemeinschaft einer Flussaue (NSG „Kühkopf-Knoblochsae“, Nördliche Oberrheinniederung, Hessen) Dissertation an der TH Darmstadt, 79 S., Verbreitungskarten und Anhänge.

KREUZIGER, J. (1997): Die Entwicklung der Brutvogelwelt des NSG „Kühkopf-Knoblochsae“. - *Collurio* 15: 7-8

KREUZIGER, J. (1997): Die aktuelle Situation des Buntspechts (*Dendrocopos major*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsae“. (Kreis Groß-Gerau) als Folge waldbaulicher Maßnahmen. - *Collurio* 15: 29-36.

KREUZIGER, J. (1998): Früheste Herbstbeobachtung des Rothkehlpiepers (*Anthus cervinus*) in Hessen. - *Collurio* 16: 66-68.

KREUZIGER, J. (1998): Zur Bestandsentwicklung und Phänologie der größten hessischen Graureiherkolonie (*Ardea cinerea*) im Europareservat Kühkopf-Knoblochsae (Kreis Groß-Gerau). - *Collurio* 16: 47-55.

KREUZIGER, J. (1998): Die Auswirkung großflächiger Renaturierungsprozesse auf die Brutvogelgemeinschaft einer Flussaue. - *Vogelwelt* 119(2): 65-90.

KREUZIGER, J. (1998): Die Bedeutung von Sukzessions-Renaturierungsprozessen für die Vogelgemeinschaft einer Flussaue (NSG „Kühkopf-Knoblochsae“, Nördliche Oberrheinniederung, Hessen). - *Journal für Ornithologie* 139: 372-373.

KREUZIGER, J. (1999): Brutkolonien des Komorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsae“. - *Vogel und Umwelt* 10: 54-56.

KREUZIGER, J. (1999): Der Baumpieper (*Anthus trivialis*) im NSG Kühkopf-Knoblochsae - eines der letzten Refugien in Südhessen? - *Collurio* 17: 67-74.

KREUZIGER, J. (1999): Starke Reduzierung forstwirtschaftlicher Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Spechte in einem der größten Auwaldgebiete Deutschlands (NSG Kühkopf-Knoblochsae, Kreis Groß-Gerau). *Vogel und Umwelt* 10: 21-38.

KREUZIGER, J. (2000): Zum Auftreten der Kandagans (*Branta canadensis*) im NSG Kühkopf-Knoblochsae (Kreis Groß-Gerau). - *Collurio* 18: 81-86.

KREUZIGER, J. (2001): "Heute hier - morgen dort": Bestandsentwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*) im NSG "Kühkopf- Knoblochsau" (Kreis Groß-Gerau). - Vogel und Umwelt 12(1): 33-45.

KREUZIGER, J. (2001, i.E.): Die Entwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau), mit einigen Anmerkungen zur überregionalen Bestandszunahme. – *Luscinia* 56: XXX.

KREUZIGER, J. (2002): Die Brutvogelwelt des NSG Kühkopf-Knoblochsau im Wandel der Zeit. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 50-56.

KREUZIGER, J. (2008): Die aktuelle Situation im EU-Vogelschutzgebiet „Hessische Rheinauen mit Kühkopf-Knoblochsau. *Collurio* Nr. 26: 40-53

KRISTAL, Ph. M. (1978): Schmetterlingsfauna des Kühkopf. - Die Naturschutzgebiete in Hessen, Darmstadt.

KUHLKE, F. 2013: Vegetationsentwicklung nach einer Renaturierungsmaßnahme am Rhein im hessischen Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. Diplomarbeit am Institut für Geographie und Geologie Bereich WWF-Auen-Institut, Karlsruher Institut für Technologie: 86 Seiten

LANDSCHULZE, I (2010).: Untersuchung einer natürlichen Verjüngungsfläche der Schwarzpappel (*Populus nigra* L.) im Uferbereich am Oberrhein bei Darmstadt. Bachelor-Arbeit, Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Biologie: 38

LEDESMA-KRIST, G. M.; NICK, P.; DAUMANN, J.; MAUL, E. & DISTER, E. (2013): Überlebenssicherung der Wildrebe *Vitis vinifera* L. ssp. *Sylvestris* C.C. Gmel. In den Rheinauen durch gezieltes in situ-Management. Abschlussbericht 2008-2013. 94 S. + Anhänge

LELEK, A. (1978): Die Bedeutung der Altrheine für die Fischfauna des Rhein-Hauptstroms am Beispiel des Schusterwörther-Altrheins, *Courier* Forschungsinstitut Senckenberg 35.

LIPPMANN, J. (1998): Stelzenläufer auf dem Kühkopf. – *Collurio* 16: 64-65.

LÖTSCHERT, W. (1979): Die Pflanzenwelt des Kühkopfes und benachbarter Altrheingebiete. - In: Pfeiffer (1971): 24-37.

LÖTSCHERT, W. (1979): Die Pflanzenwelt des Kühkopfes und benachbarter Altrheingebiete - In: Pfeiffer (1979): 35-51.

LUBIENSKI M. & BAUMGÄRTEL R. 2012: Der Erstdnachweis der triploiden Schachtelhalmhybride *Equisetum x ascendens* Lubiencki & Bennert (*Equisetaceae*) für Hessen. *Botanik und Naturschutz in Hessen* 25: 31–41.

LUDEWIG K., DONATH T. W., ZELLE B., ECKSTEIN R. L., MOSNER E., OTTE A. & JENSEN K., Stand 07.05.2015, Effects of Reduced Summer Precipitation on Productivity and Forage Quality of Floodplain Meadows at the Elbe and the Rhine River

LUDEWIG K., ZELLE B., ECKSTEIN R.L., MOSNER E., OTTE A. & DONATH T.W. 2014: Differential effects of reduced water potentials on the germination of floodplain grassland species indicative of wet and dry habitats. *Seed Science Research* 24: 49-60

LUTZ, M.(2008): Zusammensetzung und räumliche Verteilung der Vegetation als Folge kleinräumiger Morphodynamik an einem unbefestigten Rheinufer um Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. – Diplomarbeit im Studiengang Geoökologie der Universität Karlsruhe: 0-150

MANGOLD, D. (2013): Analysen zur Ausbreitung des Uhus (*Bubo bubo*) in den Flussauen des Oberrheingrabens – Bachelorarbeit, Karlsruher Institut für Technologie: 52

MANZKE, W. & WENTZEL, M. (2003): Zur Moosflora des Kühkopfes und der Knoblochsau (Nördliche Oberrheinniederung, Hessen): Die Moose der Kopfweiden. - *Hessische Floristische Briefe* 52: 40-61.

MAYBERG, B.U. (1971): Die Besiedelung des NSG Kühkopf-Knoblochsau mit Greifvögeln im Jahre 1967. - In: Pfeiffer (1971): 107.

MAYBERG, B.U. (1979): Die Siedlungsdichte der Greifvögel im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - In: Pfeiffer (1979): 157.

MAYER, W. (1998): Das NSG Kühkopf-Knoblochsau - ein traditioneller Überwinterungsplatz der Saatgans (*Anser fabalis*) - *Collurio* 16, 36-46.

MAYER, W. (2000): Brutbestand der Elster (*Pica pica*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau und Umgebung. – *Collurio* 18: 35-36.

- MAYER, W. (2001): Wasserstandsabhängigkeit des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in der Überflutungsau NSG Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau/Hessen). - *Collurio* 19: 1-10.
- MAYER, W., B. & R. TEETZ (1997): Bestandszunahme des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) im hessischen Ried. – *Collurio* 15: 19-24.
- MAYER, W. & ZETTL, H.: Artenliste zur Avifauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- MECKE, T. (2002): Das Naturschutzgebiet im Spiegel der Administrationen -Was ist besser geworden? - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 18-21.
- MENGES, S. (2021): Erfassung des Vitalitätszustands und des Standortpotenzials einer Stieleichenpopulation in der Hartholzau entlang des Neurheins im Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsau“. Bachelorarbeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Fakultät für Umwelt und Natürliche Ressourcen. 1-43.
- MERKEL, F.W. (1979): Vom Tierleben des Kühkopfes und der Knoblochsau. - in: Peifer (1979): 52-95.
- MOROSCHAN, J.(2018): Landschaftsökologische Untersuchung der Flussinsel Kühkopf Veränderung der Kernflächen und Bezug zu Habitatpotenzialen. – Projektarbeit des Fachbereiches Agrarwissenschaften, Ökotropologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen: 0-12
- MOSNER, E., HORCHLER, P. (2014): Auswirkungen des Klimawandels auf die Vegetation der Flussauen.Schlussbericht KLIWAS-Projekt 5.06. KLIWAS-53/2014. BfG, Koblenz. DOI: 10.5675/Kliwas_53/2014_5.06 URL: http://doi.bafg.de/KLIWAS/2014/Kliwas_53_2014_5.06.pdf
- MÜLLER, D. (2015): Der „Grüne Tisch“ - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 9 – 12
- NIETSCH, JÖRG (1989): Leben zwischen Wasser und Land. Das Naturschutzgebiet Kühkopf.Knoblochsau. - Nationalpark Nr. 62 1/98
- NOBIS, R. (1999): Vergleich des Einflusses unterschiedlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Vegetation von vier Auenschutzprojekten in Nordwest-Europa mit Darstellung des Gesamtprojekts. - Diplomarbeit im Fach Landschaftsökologie der WWU Münster.
- PETERMANN, P., KREUZIGER, J. & FRIEMANN, H. (1995): 30 Jahre Wasservogelzählung im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. – *Collurio* 13: 5-66.
- PETERS, D. (1978): Ergebnisse der Vogelzählung am Schusterwörther-Altrhein, Courier Forschungsinstitut Senckenberg 35
- PFEIFER, S. (1934): Die Fischreiher der Rheininsel Kühkopf. 10. Jahresbericht 1933-34
- PFEIFER,S. (1957): Starker Einflug der Dreizehnmöve im Winter 1956/57. - *Lusc.* 30: 24-25.
- PFEIFER, S. (Hrsg.) (1971): Das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, Frankfurt a.M.: A. Büchse u. E. Strobach.
- RECKER, U. (2015): Dynamik ist die einzige Konstante – Schutzkonzepte für die gewachsenen historischen Kulturlandschaften Hessens - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 27 – 31
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, Obere Naturschutzbehörde 1991: 3. Wanderführer Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau.
- REIF, A., BAUMGÄRTEL, R., DISTER, E., SCHNEIDER, E (2016).: Zur Natürlichkeit der Stieleiche (*Quercus robur* L.) in Flussauen Mitteleuropas – eine Fallstudie aus dem Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsau“ am hessischen Oberrhein. - 15: 69-92. *Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz*: 69-92.
- REIF, A. & BAUMGÄRTEL, R. & DISTER, E. & SCHNEIDER, E. (2019): Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche- Fallbeispiel NSG Kühkopf Knoblochsau in Hessen. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* Band 18: 96-101
- RENKER, C., WEITMANN, G. & GROH, K (2011).: Bericht über die 48. Jahrestagung der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2009 in Mainz. In *Mitteilung der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft*, Heft 86: 25 –36
- ROTHENSTEIN, RITA (1999): Zur Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen, Diplomarbeit TU Berlin, unveröffentlicht.
- ROTHMANN, K. (1957): Der große Brachvogel als Brutvogel in Südhessen. - *Lusc.*30: 18-19.
- ROTHMANN, K. (1957): Beobachtungen an seltenen Entenvögeln in den Altrheingebieten. - *Lusc.* 30: 24-25.
- ROTHMANN, K. (1960): Weißflügelseeschwalbe am Erfelder Altrhein. - *Lusc.* 33: 44.

- ROTHMANN, K. (1960): Massenaufreten von Sommergoldhähnchen im Winter 1958/59 auf dem Kühkopf. - Lusc. 33: 47-48.
- SCHÄFER, W. (1973): Der Oberrhein, sterbende Landschaft? - Natur und Museum 103 (1).
- SCHÄFER, W. (1978): Der Oberrhein, ökotechnisch gesehen. Courir Forschungsinstitut Senckenberg 31.
- SCHÄFER, W. (Hrsg.) (1978): Ökologische Modelluntersuchungen „Schusterwörther Altrhein“, Courier Forschungsinstitut Senckenberg 35.
- SCHAFFRATH, U. (2011): Untersuchung der xylobionten Käferfauna im NSG Kühkopf-Knoblochsau Karlsruh und Rindswörth 2008 -2010. Studie im Auftrag der HGON: 132
- SCHINER, S. (1998): Raum-Zeit-Muster überwinternder Kormorane *Phalacrocorax carbo sinensis* am nördlichen Oberrhein (NSG Kühkopf-Knoblochsau). - Vogel und Umwelt 9(5): 251-261.
- SCHMIDT, M. & MEYER, P. (2011): Hessische Naturwaldreservate im Portrait, Karlsruh. Herausgeber: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-VA), Landesbetrieb HESSEN-FORST: 39
- SCHMIEDE R., DONATH T.W. & OTTE A. 2009: Seed bank development after the restoration of alluvial grassland via transfer of seed-containing plant material. *Biological Conservation* 142: 158-167.
- SCHMIEDE, R. & HARNISCH, M. & OTTE, A. & DONATH, T. (2011): Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein-aktuelle Renaturierungsmaßnahmen und Perspektiven für ihre Erhaltung. *Collurio* Nr.28 (2010): 69-81
- SCHMIEDE R., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Artenanreicherung durch Mahdgutübertragung in artenarmen Grünland-beständen – welche Störungsintensität der Grasnarbe ist nötig? *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 115: 153-171
- SCHMIEDE R., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Enhancing plant biodiversity in species-poor grassland through plant material application – the impact of sward disturbance. *Applied Vegetation Science* 15: 290-298
- SCHMIEDE R., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Artenanreicherung durch Mahdgutübertragung in artenarmen Grünland-beständen – welche Störungsintensität der Grasnarbe ist nötig? *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 115: 153-171
- SCHMIEDE R., RUPRECHT E., ECKSTEIN R.L., OTTE A. & DONATH T.W. 2013: Establishment of rare flood meadow species by plant material transfer: experimental tests of threshold amounts and the effect of sowing position. *Biological Conservation* 159: 222-229
- SCHNEIDER, E. (1995): Zur Vegetationsentwicklung auf den aufgelassenen Ackerflächen des Kühkopfs und das damit verbundene Auftreten seltener Arten. – *Collurio* 13: 67-78.
- SCHNEIDER, E. (2002): Vom Acker zur Auenwiese. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 44-50.
- SCHNELL, M. (2011): Untersuchungen zu Nahrungsgewohnheiten und Störreizen überwinternder Tundrasaatgänse (*Anser fabalis rossicus*) und Blessgänse (*Anser albifrons*) im Hessischen Ried mit der Ableitung von Handlungsempfehlungen für ein zukünftiges Gänsemanagement. Bachelorarbeit Hochschule RheinMain, Fachbereich Geisenheim, Studiengang Landschaftsarchitektur: 74
- SCHÖCKER, G. (2015): Das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 3 - 9
- SCHRIMPF, A. (1979): Untersuchungen am Crustaceenplankton in den hessischen Naturschutzgebieten „ Kühkopf-Knoblochsau und „Lampertheimer Altrhein“, Zool. Institut der TH Darmstadt, unveröffentlicht.
- SCHULER, J. (2015): Baumbewohnende Ameisen mitteleuropäischer Auenwälder. Artenspektrum und Ökologie arborikoler Ameisen in naturnahen Hartholzauen an Rhein, Elbe und Donau. Zürich, Bristol-Stiftung; Bern, Haupt. 131.
- SINTERMANN, J. (2008): Sedimentationsinduzierte Nährstoffgradienten in Auenwiesen am hessischen Oberrhein. Diplomarbeit des Institut für Landschaftsökologie der Wilhelms-Universität Münster.
- STEIDL, M. (2018): Landschaftsstrukturanalyse im Naturschutzgebiet Kühkopf. – Projektarbeit des Fachbereiches Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen: 0-20
- STREHLOW, CARSTEN. 2013: Die Erfassung und Bewertung der Bedürfnisse von Erholungssuchenden für eine Verbesserung im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“, Bachelorarbeit Hochschule Geisenheim University, Studiengang Landschaftsarchitektur: 79 Seiten
- TRZASKA, J. (2007): Konzept für naturverträgliche Naherholung im südlichen Kreis Groß-Gerau. Überprüfung von Nutzungskonflikten in den Hessischen Rheinauen. Diplomarbeit der Universität Mainz; 171 Seiten.

- VALENTIN, K. 2008: Vegetations- und Nährstoffgradienten in Auenwiesen am nördlichen Oberrhein. Diplomarbeit des Institut für Landschaftsökologie der Wilhelms-Universität Münster.
- VIERTEL, B. (1980): Die Amphibien des hessischen Naturschutzgebietes Kühkopf-Knoblochsau - Natur und Museum 110(1).
- VITZTHUM, A.L. (2019): Untersuchung der natürlichen Verjüngungspotentials der Hauptbaumarten im Bereich der Hartholzaue unter der Berücksichtigung der Überflutungsempfindlichkeit und des Wildverbisses. – Masterarbeit im Studiengang Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie: 0-105
- WAGNER, J. (2015): Natürlich Etablierung der Stieleiche (Q.r.L.) in der rezenten Aue des Oberrheins im Naturschutzgebiet Kühkopf, Hessen. Bachelorarbeit an der Albert-Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau, Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen: 72 Seiten
- WEHNER, R. (1968): Von der Natürlichkeit der Natur (Bsp. Kühkopf). - Natur und Museum 98.
- WERNER, H. (1960): Rohrschwirl im hessischen Altrheingebiet. - Lusc. 32, 19-21.
- WINKEL, S. (1987): Der Einfluss des Überflutungsregimes auf die epigäischen Anthropoden (Käfer) semiterrestrischer Standorte der Rheinaue (Kühkopf, Hessen), Diplomarbeit Biologie, Uni Frankfurt.
- WINKEL, S, FLÖSSER, E. 1985: Zusammenfassender Bericht über die tierökologischen Untersuchungen im NSG Kühkopf-Knoblochsau 1984/85. Unveröffentlichtes Gutachten:52
- WINTER S., JUNG L.S., ECKSTEIN R.L., OTTE A., DONATH T.W. & KRIECHBAUM M. 2014: Control of the toxic plant *Colchicum autumnale* in semi-natural grasslands: effects of cutting treatments on demography and diversity. *Journal of Applied Ecology* 51: 524-533.
- ZETTL, H. (1959): Purpurreiher auf dem Kühkopf. - Lusc. 32: 39.
- ZETTL, H. (1959): Rotfußfalke im NSG Kühkopf-Knoblochsau beobachtet - Lusc. 32: 30.
- ZETTL, H. und ROTHMANN, K. (1959): Beobachtungen an Limikolen in Südhessen. - Lusc. 32: 19-21.
- ZETTL, H. (1962): Über die Bestandszunahme der rheinischen Weidenmeise seit 1953 im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Lusc. 35: 41.
- ZETTL, H. (1962): Schwanzmeise als Bodenbrüter auf dem Kühkopf. - Lusc. 35: 41.
- ZETTL, H. (1962): Die große Rohrdommel als Durchzügler in den Brüderlöchern im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Lusc. 35: 27.
- ZETTL, H. (1963): Beobachtungen vom NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Mitt.O.A.O. 12: 27.
- ZETTL, H. (1963): Kann die Brutkolonie der Graureiher auf dem Kühkopf im NSG Kühkopf-Knoblochsau erhalten bleiben? - Mitt.O.A.O. 12: 25.
- ZETTL, H. et al. (1971): Die Vogelwelt des NSG Kühkopf; in Pfeifer 1979, 59-106.
- ZETTL, H. (1979): Die Vogelwelt des NSG Kühkopf. - in Pfeifer 1979,105-150.
- ZETTL, H. (1995): Über die Entwicklung der Wälder im NSG Kühkopf-Knoblochsau. – *Collurio* 13: 79-84.
- ZETTL, H. (1995): Zu viel Wasser für die Aue Problemfall „Kühkopf-Knoblochsau“ - „Nationalpark“ 1/95.
- ZETTL, H. (1996): Das NSG Kühkopf-Knoblochsau – Veränderungen einer Rheinlandschaft. – *Jahrbuch Naturschutz Hessen* 1: 121-126.
- ZETTL, H. (2002): 50 Jahre Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsau". Ein Spaziergang durch Raum und Zeit. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 10-18.
- ZETTL, H. (2002): Greifvogeldichte als Weiser für Biotopqualität. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 60-64.
- ZETTL, H. (2005): Die alten Rheinschlingen zwischen Gernsheim und Oppenheim. - *Collurio* 23, 126-132.
- ZETTL, H. (2007): Veränderungen in den hessischen Oberrheinauen – Eine Bestandsaufnahme rund um das NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. *Collurio* Nr. 25 (2007), 45 –51.
- ZETTL, H. (2008): Gelöste und ungelöste Probleme im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. *Collurio* Nr.26: 54-60.