

Spezielle Literatur

ACHENBACH et al. (1993): Mindestbestand des Neuntöters (*Lanius collurio*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau im Jahr 1993. – *Collurio* 11: 48-52.

ACHENBACH, E.L. (1996): Markierte Vögel im NSG "Kühkopf-Knoblochsau" –*Collurio* 14: 111-15.

AVIFAUNISTISCHE AG HESSEN 1969: 1. Wanderführer Kühkopf-Knoblochsau. Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.

BAUMGÄRTEL, R. (1996): Rehwildbejagung in einem Großnaturschutzgebiet. - *Allgemeine Forstzeitschrift* 16: 910-913.

BAUMGÄRTEL, R. (1997): Rotmilan (*Milvus milvus*) und Schwarzmilan (*Milvus migrans*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau. -*Collurio* 15: 36-46.

BAUMGÄRTEL, R. (1999): Urzeitkrebse in der hessischen Rheinaue. – *Collurio* 17: 151-53.

BAUMGÄRTEL, R. & ZEHM, A. (1999): Zur Bedeutung von Fließgewässerdynamik für naturnahe Rheinufer unter besonderer Betrachtung der Schwarzpappel (*Populus nigra*) und Sandrasen. - *Natur und Landschaft* 12 : 530-535.

BAUMGÄRTEL, R. (2002): Informationszentrum Kühkopf-Knoblochsau. - *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* 6: 177-179.

BAUMGÄRTEL, R. (2002): Vom Kühkopfkuratorium bis zur modernen Besucherlenkung. - *50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau*, 23-25.

BAUMGÄRTEL, R. & GRÜNKLEE, W. (2002): Sukzession nach Dambruch auf ehemaligen Ackerflächen in der Rheinaue: Ergebnisse nach 17 Jahren ungestörter Sukzession auf der Rheininsel Kühkopf. - *Natur und Landschaft* 6/2002: 269-273.

BAUMGÄRTEL, R. (2003): Fundmeldungen. Neufunde - Bestätigungen - Verluste. Nr. 964-965. - *Botanik und Naturschutz in Hessen* 16: 58.

BAUMGÄRTEL, R. (2004): NSG-Kühkopf mit Informationszentrum im Internet, *Jahrbuch Naturschutz* 8: 183

BAUMGÄRTEL, R. (2004): *Agropyron cristatum* subsp. *pectinatum*, *Lindernia dubia*. *Botanik und Naturschutz in Hessen* – Fundmeldungen – Nr. 17. 2004:123

BAUMGÄRTEL, R. (2004): Zur aktuellen Situation der Hartholzauenwälder im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsau"; *Botanik und Naturschutz in Hessen* 17: 53 -63.

BAUMGÄRTEL, R. (2007): Initialisierung von Hartholzauwald am nördlichen Oberrhein unter besonderer Berücksichtigung der Stieleiche (*Quercus robur*) -*Nationalpark-Jahrbuch Unteres Odertal* 2006:86-90.

BAUMGÄRTEL, R. (2007): Anlage von Auwald durch Umbau von Hybridpappelbeständen am nördlichen Oberrhein. *Forst und Holz*, März 2007:26-29.

BAUMGÄRTEL, R. (2008): Der Eschen-Ahorn (*Acer negundo*) am nördlichen Oberrhein. Beitrag zur naturschutzfachlichen Einschätzung eines Neophyten. *Botanik und Naturschutz in Hessen* 21, 5-9.

BAUMGÄRTEL, R. (2009): Besucherlenkungskonzepte in Naturschutzgebieten –einladen oder aussperren? – In Wolf/Appel-Kummer: *Naherholung in Stadt und Land*, Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2009: 272-280.

BAUMGÄRTEL, R. (2009): *Salvinia natans*. *Botanik in Hessen* 22 – Fundmeldungen: S.166

BAUMGÄRTEL, R. & DONATH T. (2010): Exkursion 1: Die nördliche Oberrheinniederung - *Tuexenia*. Beiheft Nr. 3 zur Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft (FlorSoz) in Gießen 2010: 27 – 39.

BAUMGÄRTEL, R. (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste. Nr.1753–1767. *Botanik und Naturschutz in Hessen* 24: 107–111.

BAUMGÄRTEL, R. (2012): *Bromus arvensis* subsp. *arvensis* u.a. Fundmeldungen in *Botanik und Naturschutz in Hessen* 25: 93–94.

BAUMGÄRTEL, R. (2014): Schatzinsel Kühkopf. *Naturschutz in Hessen, Jahrbuch Band 15, 2013/2014*. S. 174-178

BAUMGÄRTEL, R. & WESTPHAL, P. (2015): Umweltbildung – Warum lernen wir an Flüssen so gut? – Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 21 – 27

BAUMGÄRTEL, R. (2016): Floristische Kartierung Teilbereiche Kühkopf und Umgebung des Messtischblattes, <http://www.rp-da.de/arten/flora.htm>

BERCK, K. H. (1959): Beobachtung einer übersommernden Reiherente, einer Eiderente auf dem Kühkopf. - Lusc. 32, 29-30.

BERCK, K.H. (1962): Wintervorkommen des Rotmilans im Rheingebiet - Lusc. 35, 31-32.

BERMAN, S. & BIANCHARD, R. (1996): The Social Design of Nature. A Focus on Kühkopf Island, Germany. An interactive qualifying project submitted to the faculty of Worcester Polytechnic Institute.

BERNDT, A. (2008): Blaukehlchen in Rapsfeldern –Vom Feuchtgebietsspezialisten zum Ackerbrüter. Diplomarbeit des Institut für Landschaftsökologie der Wilhelms-Universität Münster.

BISSELS S., HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Population structure of the threatened long-lived perennial *Serratula tinctoria* in relation to vegetation and management. -Applied Vegetation Science: 7.2: 267-274.

BISSELS S., HÖLZEL N., DONATH T.W. & OTTE A. (2004): Evaluation of restoration success in alluvial grasslands under contrasting flooding regimes. -Biological Conservation: 118/5: 641-650.

BISSELS S., DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2005): Ephemeral wetland vegetation of irregularly flooded arable fields: the importance of persistent soil seed banks. - Phytocoenologia 35: 469-488.

BISSELS S. (2005): Restoration of alluvial grasslands: Effects of flooding and management on plant dispersal and recruitment. Doktorarbeit Universität Gießen

BISSELS S., DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2006): Effects of different mowing regimes on seedling recruitment in alluvial grasslands. - Basic and Applied Ecology 7: 433-442.

BÖGER, K. (1991): Grünlandvegetation im hessischen Ried, Pflanzensoziologische Verhältnisse und Naturkonzeption, gekürzte Fassung der Dissertation TH Darmstadt, Frankfurt a.M.: Schriftenreihe der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen.

BOETTGER, C.R. (1907): C.R.: Zur Conchylienfauna des Kühkopf (Rheininsel). - Nachr. Bl. Dtsch. Malak. Ges. 48, 17-19, Frankfurt/M.

BUNDESAMT FÜR DEN NATURSCHUTZ (1994): Technisches Handbuch. 3. Fassung FFH-Richtlinie, Anhänge I, II, IV und V (bearbeitet vom Institut für Biotopschutz und Landschaftsökologie) Bonn.

BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ HESSEN (1998): Forstwirtschaft im Europareservat. - Naturschutz und Landschaftsplanung 30: 34-35.

BURMEIER S., ECKSTEIN R.L., DONATH T.W. & OTTE A. 2008: Samenbankentwicklung und -dynamik in Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein. Treffpunkt Biologische Vielfalt 8: 133-138

BURMEIER S., ECKSTEIN R.L., DONATH T.W. & OTTE A. 2011: Plant pattern development during post-restoration succession in grasslands – a case study of *Arabis nemorensis*. Restoration Ecology 19: 648-659

CECANNE R. & EICHLER M. (2009): Flechtenkundliche Erhebungen im FFH-und Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsau“. Gutachten im Auftrag des Regierungspräsidiums Darmstadt.

CECANNE R. & EICHLER M. (2009): Flechtenkundliche Erhebungen im Naturwaldreservat „Karlswörth“ –Erstaufnahme. Gutachten im Auftrag der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt.

DETTINGER-KLEMM, A.: Artenliste zur Amphibien- und Reptilienfauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.

DIESTER, E. (2002): Der Kühkopf - ein Auen-Schutzgebiet von europäischer Bedeutung. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 5-10.

DIESTER, E., DIRINGER, G., OBRDLIK, H., BERNHART, H. & KONTUSCH, L. (2003): Vorstudie für die Sanierung des Neurheinufers im Bereich des Naturschutzgebietes „Kühkopf-Knoblochsau“: 28 pp. + Karten; Rastatt.

DISTER, E. & ZETTL, H. (1978): Kühkopf-Knoblochsau in Hillesheim-Kissel: Die Naturschutzgebiete Hessens. - Darmstadt: Institut für Naturschutz, Schriftenreihe XI,3

- DISTER, E. (1980): Geobotanische Untersuchungen in der Hessischen Rheinaue als Grundlage für die Naturschutzarbeit. - Dissertation Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Georg August-Uni Göttingen.
- DISTER, E. et al (1987): Erfassung der tierischen und pflanzlichen Sukzession auf den aufgelassenen Ackerflächen des Kühkopf. - Rastatt: WWF-Aueninstitut, unveröffentlicht.
- DONATH T. W. & HÖLZEL, N. (2001): The impact of site conditions and dispersal on restoration success. -Verh. Ges. f. Ökol. 31:212.
- DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2003): The impact of site conditions and seed dispersal on restoration success in alluvial meadows. - Applied Vegetation Science 6.1: 13-22.
- DONATH T.W., HÖLZEL N., BISSELS S., & OTTE A. (2004): Perspectives for incorporating biomass from non-intensively managed temperate flood meadows into farming systems. - Agriculture, Ecosystems & Environment: 104: 439-451.
- DONATH T.W. (2005): Restoration of flood meadows - the importance of seedbanks, dispersal, recruitment and agricultural management. Doktorarbeit Universität Gießen
- DONATH T.W., BISSELS S., HANDKE K., HARNISCH M., HÖLZEL N. & OTTE A. (2006): E + E-Vorhaben "Stromtalwiesen"- Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung. - Natur und Landschaft 11: 529-535
- DONATH T.W., HÖLZEL N. & OTTE A. (2006): Influence of competition by sown grass, disturbance and litter on recruitment of rare flood-meadow species. Biological Conservation 130: 315-323.
- DONATH, T. et al. (2006): E + E-Vorhaben „Stromtalwiesen“, Renaturierung von Stromtalwiesen am Hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung -Natur und Landschaft 11/2006, 529-536.
- DONATH T.W., BISSELS S., HÖLZEL N. & OTTE A. (2007): Large scale application of diaspore transfer with plant material in restoration practice - impact of seed and microsite limitation. - Biological Conservation 138: 224-234.
- DONATH T.W. & ECKSTEIN R.L. 2008: Die Bedeutung genetischer Faktoren für die Wiederansiedlung seltener Pflanzengemeinschaften. Naturschutz und Landschaftsplanung 40: 21-25.
- DONATH T.W., SCHMIEDE R., HARNISCH M., BURMEIER S., ECKSTEIN R.L. & OTTE A. 2009: Renaturierung von Auenwiesen - Perspektiven für die langfristige Entwicklung. ANL Laufener Spezialbeiträge 2/09: 122-132
- DONATH, T. & BAUMGÄRTEL, R. (2010): Exkursion 1: Die nördliche Oberrheinniederung.
- In Otte, A et al.(2010): Exkursionsführer zur Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Gießen 2010: 27–42
- ECKSTEIN, R. L., DANIHELKA, J., HÖLZEL, N. & OTTE, A. (2004): The effects of management and environmental variation on population stage structure in three river-corridor violets. - Acta Oecologica 25: 83-91.
- ECKSTEIN R.L. & DONATH T.W. (2005): Interactions between litter and water availability affect seedling emergence in four familial pairs of floodplain species. - Journal of Ecology 93: 807-816.
- EG-VOGELSCHUTZ-RICHTLINIE: Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung wildlebender Vogelarten (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft, Reihe L 103: 1-6).
- ERNST, M. (2000): Die Entstehung von Sukzessionsgrünland auf dem Kühkopf aus der Sicht der Pflegeplanung. – Collurio 18: 150-160.
- ERNST, M. (2002): Kühkopf-Knoblochsäue: Ein Schutzgebiet von internationaler Bedeutung. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsäue, 21-23.
- ERNST, M. (2007): Die Schmetterlingsfauna des NSG „Kühkopf-Knoblochsäue“. Collurio Nr. 25 (2007), 161–180.
- ERNST, M.(2008): Verbreitung der Haarstrangwurzeule (Gortyna borelii Pierret 1837) in Hessen. Vorschlag eines Bewertungsschemas für den Erhaltungszustand von Populationen. Naturschutz und Landschaftsplanung. Zeitschrift für angewandte Ökologie, 37, H. 12: 376-383.
- ERNST, M. (2008): Die Schmetterlingsfauna des NSG und FFH-Gebietes "Kühkopf-Knoblochsäue" unter besonderer Würdigung auentypischer Arten. Jahrbuch Naturschutz in Hessen, Band 12, S. 55-74, Zierenberg.
- ETZEL, F. (1999): Dendroökologische und dendroklimatologische Informationen aus Eichen in Südhessen/NSG Kühkopf-Knoblochsäue. -Diplomarbeit Fachbereich 18, Geographie, Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main.

- FAUST, B. (1965): Beobachtungen seltener Limikolen in Hessen. - Lusc. 38/2: 108.
- FEIST, O. (1962): Beutelmeise erneut auf dem Kühkopf beobachtet. - Orn. Mitt. 1/62: 17.
- FEIST, O. (1963): Beobachtungen über Wirtsvögel des Kuckucks bei Erfelden. - Lusc. 36, 72-74.
- FLÖSSER, E. (1987): Die Anthropoden der Pionierphase der Primärsukzession auf neu entstandenen Sandflächen der Rheinaue (Kühkopf, Hessen). Diplomarbeit im Fach Biologie der Uni Frankfurt.
- FRIEMANN, H. (1964): Beobachtung auf der Rheininsel Kühkopf. Jahresber. d.O.A.O. 2.: 23-26.
- FRIEMANN, H. & STRAUBE (1967): Schwarzstörche auf dem Kühkopf. -Lusc. 40(1): 16.
- FRIEMANN (2002): Internationale Wasservogelzählungen am Kühkopf. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 56-60.
- FRIEZE, W. (2003): Die Schwedensäule bei Erfelden. - Denkmalpflege & Kulturgeschichte 1/2003; 36 -41.
- FRITZ, H.G., HEIMER, W. 1981: Stechmückenbrutplätze im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. Untersuchungen zur Begleitfauna, Möglichkeiten einer Minderung der Stechmückenplage. Natur und Landschaft 56:80-84.
- GANSE, P. (1965): Maibeobachtung des Kranichs vom Kühkopf. - Lusc. 38(2): 107.
- GERDES, S. (2008): Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein –eine GIS-basierte Analyse. Diplomarbeit, Institut für Landschaftspflege der Wilhelms-Universität Münster.
- GIERSBERG, H. (1971): Vom Tierleben des Kühkopfes und der Knoblochsau. - In Pfeifer (1972): 38-58.
- GONNERMANN, H. (2002): Die Wälder des Naturschutzgebietes - Von der Pappelwirtschaft zum Prozessschutz.- 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 29-44.
- GREGOR T., KÖNIG A., KORTE., MIKA M. & MÜLLER C. 2012: Gewässermakrophyten in Gräben der Oberrhein- und Untermainebene. Botanik und Naturschutz in Hessen 25:15-31
- GROH, K.: Artenliste zur Molluscafauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- GROßE-BRAUCKMANN, H. (1994): Holzersetzende Pilze des Naturwaldresevats Karlswörth. - Mitteilung der Hessischen Landesforstverwaltung, Bd. 29.
- HAAS, F. 1922: Der Kühkopf ein Zeuge der Vergangenheit des Oberrheins. Berichte der Senckenbergischen Gesellschaft 1922:29-56.
- HAEDE (1961): Beobachtung eines Sterntauchers auf dem Kühkopf. - Lusc. 34: 18.
- HAEDE (1961): Seeadler hält sich mehrere Wochen auf dem Kühkopf auf. - Lusc. 34: 20.
- HANDKE, K. (1982): Ergebnisse einjähriger Brutvogeluntersuchungen in Hessens größtem Naturschutzgebiet NSG Kühkopf-Knoblochsau. -Luscinia 44(5/6).
- HANDKE K., OTTE A. & DONATH T.W. 2011: Alternierend spät gemähte Altgrasstreifen fördern die Wirbellosenfauna in Auenwiesen. Naturschutz und Landschaftsplanung 43: 280-288
- HARNISCH, M., OTTE, A., SCHMIEDE, R., & DONATH T.W. (2014): Verwendung von Mahdgut zur Renaturierung von Auengrünland. Ulmer Eugen Verlag ISBN 978-3-8001-6949-8.
- HARTMANN, G. (2002): Den Kühkopf zum Ausdruck bringen - Kunst im Naturschutzgebiet, 25-29.
- HARTUNG, J.(2017): Der Kühkopf Jagdgebiet des Hochadels. – Förderverein Hofgut Guntershausen e.V. Stockstadt am Rhein: 1-53
- HARZBECKER, E. (1968): Beobachtungen im Naturschutzgebiet Kühkopf bei Erfelden. - Orn. Mitt. 6: 13.
- HEATH, M.F. & EVANS, M. I. (Hrsg.) (2000): Important Bird Areas in Europe. Priority sites for Conservation, Vol. 1: Northern Europe, Bird Life Conservation Series, Cambridge.
- HEIMER, W. (1983): Auswirkungen von Wasserstandsschwankungen auf Diptera /Brachycera (Insekta) in Naturschutzgebieten der Hessischen Rheinaue. - Dissertation Fachbereich Biologie der TH Darmstadt.
- HELVERSEN, O. v. (1968): Eine Zwergschabe am Kühkopf. - Lusc. 40: 112.

- HEMMEN, J. (1972): Die Mollusken-Fauna der Rheininsel Kühkopf (Naturschutzgebiet). Staatsexamensarbeit Darmstadt (unveröffentl.)
- HEMMEN, J. (1973): Die Molluskenfauna der Rheininsel Kühkopf. -Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 102: 105-107, Wiesbaden.
- HENSGEN F., ALBRECHT C., DONATH T.W., OTTE A. & ECKSTEIN R.L. 2011: Distribution of gastropods in floodplain compartments and feeding preferences for river corridor plant species: is there an effect of gastropod herbivory on the distribution of river corridor plants? *Flora* 206: 534-543
- HERZIG, G. (1999): Die Fledermäuse im größten hessischen Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. –*Collurio* 17: 11-44.
- HERZIG, G. (2002): Die Fledermäuse im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 68-72.
- HERZIG, G.: Artenliste zur Fledermausfauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- HESSISCHES FORSTEINRICHTUNGSWERK (1999): Betriebsbuch, Forstamt Groß-Gerau, Forstbetrieb Staatswald, Betriebswerk V Kühkopf-Knoblochsau, Abteilung 318-437, 1999.
- HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN und NATURSCHUTZ (1995): Hess. Biotopkartierung (HB). Kartieranleitung. 3. Fassung. Wiesbaden (unveröffentl.).
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG,WOHNEN,LANDWIRTSCHAFT,FORSTEN- UND NATURSCHUTZ (1994): Richtlinie für die Durchführung des Hess. Landschaftspflegeprogramms (HELP). Staatsanzeiger für das Land Hessen 12/1994 S.916-919.
- HGON (Hrsg.) (1995): Naturschutz-Großprojekte der HGON; unter anderem Europareservat Kühkopf-Knoblochsau; Hess. Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, Echzell.
- HILLERICH, K. (1965): Junge Schwarzmilane mit missgebildeten Schwingen und Fängen. -*Lusc.* 38/1, 13-15.
- HILLERICH, KLAUS (1983): Die Situation der Greifvögel im Rhein-Main-Gebiet. - *Vogel und Umwelt* 2/1983.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U., KARAFIAT, H. & MARQUARDT, F. (1973): Kartierung des Zweiblättrigen Blausterns (*Scilla bifolia* L.) im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsau". - *Hessische Floristische Briefe* 22(3): 34-37.
- HODVINA S., CEZANNE R., HARNISCH M. & DONATH T.W. 2007: Die Wiesen-Schwertlilie (*Iris spuria*) in Hessen. *Botanik und Naturschutz in Hessen* 19: 69-97.
- HÖLZEL N., (1999): Flora und Vegetation der Auenwiesen im NSG "Lampertheimer Altrhein" -eine aktuelle Zustandsanalyse mit Hinweisen zur zukünftigen Pflege und Entwicklung. - *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* 4: 24-42; Zierenberg.
- HÖLZEL N., (2000): Renaturierung von Stromtalwiesen durch Oberbodenabtrag und Mahdgutübertragung. - *Verh. Ges. f. Ökol.* 30: 114.
- HÖLZEL N., & OTTE A. (2001): The Impact of flooding-regime on the soil seed bank of flood-meadows. - *Journal of Vegetation Science* 12: 209-218.
- HÖLZEL N., DONATH T., BISSELS S. & OTTE A. (2002): Auengrünlandrenaturierung am hessischen Oberrhein - Defizite und Erfolge nach 15 Jahren Laufzeit. *Schriftenreihe für Vegetationskunde* 36: 131-137.
- HÖLZEL N. & HARNISCH M. (2002): Renaturierung von Stromtalwiesen. - *Garten und Landschaft* 112/8: 36-38.
- HÖLZEL N. (2003): Re-assessing the ecology of rare flood-meadows violets (*Viola elatior*, *V. pumila* and *V. persicifolia*) with large phytosociological data sets. *Folia Geobotanica* 38: 281-298.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2003): Restoration of a species-rich flood meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant material. - *Applied Vegetation Science* 6.2: 131-140.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Inter-annual variation in the soil seed bank of flood-meadows over two years with different flooding-patterns. - *Plant Ecology*: 174: 279-291.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Ecological significance of germination characteristics in flood-meadow species. - *Flora* 199: 12-24.
- HÖLZEL N. & OTTE A. (2004): Assessing soil seed bank persistence in flood-meadows: The search for reliable traits. - *Journal of Vegetation Science*: 15: 93-100.

- HÖLZEL, N. (2005): Seedling recruitment in flood-meadow species: The effects of gaps, litter and vegetation matrix. - Applied Vegetation Science 8:115-124.
- HÖLZEL N., BISSELS S., DONATH T.W., HANDKE K., HARNISCH M. & OTTE A. (2006): Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein - Ergebnisse eines E + E-Vorhabens des Bundesamtes für Naturschutz. - Naturschutz und biologische Vielfalt 31: 263.
- HÖLZEL, N. ET.AL. 2006: Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein. Bd. 31 Reihe: Naturschutz und Biologische Vielfalt des Bundesamtes für Naturschutz – Bonn- Bad Godesberg 2006:263.
- HÖLZEL, N.: Re-assessing the synecology of three rare violet species with large phytosociological datasets (eingereicht zur Veröffentlichung bei Journal of Vegetation Science).
- HÖLZEL, N.: Assessing the usefulness of C-S-R functional types in practical applications at the community level: two examples from Central European Grassland (eingereicht zur Veröffentlichung bei Journal of Applied Ecology).
- HÖLZEL, N. & OTTE, A.: Restoration of a species-rich flood meadow by topsoil removal and diaspore transfer with plant litter (eingereicht zur Veröffentlichung bei Applied Vegetation Science).
- HÖLZEL, N. et al.: Auengrünlandrenaturierung am hessischen Oberrhein - Defizite und Erfolge nach 15 Jahren Laufzeit, Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 36, 131-137, Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
- JUNG L., DONATH, T., ECKSTEIN, L., OTTE, A. 2012: Regulierung der Herbst-Zeitlose (*Colchicum autumnale* L.) in extensiv genutztem Grünland. Endbericht DBU, 89 Seiten
- JUNG L.S., ECKSTEIN R.L., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Above- and below-ground nutrient and alkaloid dynamics in *Colchicum autumnale*: optimal mowing dates for population control or low hay toxicity. Weed Research 52: 348-357
- KAFFENBERGER, C. (2015): Denkmalpflege – Ein Akt der Nachhaltigkeit - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 12 – 21
- KAISER, D.F. (2018): Ökologische Beurteilung des Flächennutzungswaldes am Hessischen Oberrhein zwischen 1829 und 2015 mit dem Schwerpunkt Auengrünland. – Hausarbeit des Fachbereiches Agrarwissenschaften, Ökotropologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen: 0-15
- KINZELBACH, R. und MARTENS, J. (1964): Die Beutelmeise am Oberrhein. - J. Orn. 2: 137-148.
- KLÄGE, H.C. (1992): Strategien zum Schutz von Ackerwildpflanzen- 10 Jahre Schutz von Ackerpflanzen in der nordwestlichen Niederlausitz. - Biologische Studien 21: 79-81
- KLUGE, W. 1982: Naturschutz, Erholung und Forstwirtschaft im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. Diplomarbeit Forstwissenschaftliche Fakultät Freiburg im Juni 1982: 1-160.
- KNÜVER, A. (2010): Molekulargenetische Charakterisierung einer natürlich regenerierten Schwarzpappelpopulation auf einem Pionierstandort im Naturschutzgebiet Kühkopf (Oberrhein). Wissenschaftliche Hausarbeit Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Biologie: 70
- KÖNIG, A. (1983): Der Kreis Groß-Gerau als Lebensraum bestandsbedrohter Vogelarten, Deutscher Bund für Vogelschutz, Kreisverband Groß-Gerau.
- KONRAD, A. (2018): Die Entwicklung der Ufer des Kühkopfs von 1829 bis 2015. – Projektarbeit des Fachbereiches Landschaftsökologie und Ressourcenmanagement: 0-21
- KORTE, E. (1999): Bestandsentwicklung der Fischarten der hessischen Rheinaue 1994-1997; Dissertation Uni Marburg; Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz Heft 268, Hess. Landesanstalt für Umweltschutz.
- KORTE, E. (2002): Die Fischfauna im Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 64-68.
- KORTE, E.: Artenliste zur Fischfauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- KORTE, E. & GREGOR, T. (2008): Neue Characeenfunde aus Hessen. Rostocker Meeresbiologische Beiträge Heft 19:7-12.
- KORTE, E. (2009): *Groenlandia densa*, *Nymphoides peltata*, *Potamogeton angustifolius*, *Potamogeton gramineus*, *Trapa natans*. Botanik in Hessen 22: 187-188.
- KORTE, E, GREGOR, T & KÖNIG, A (2009): Aquatische Makrophyten in hessischen Stillgewässern. Botanik in Hessen 22: 11-46.

- KORTE, E., GREGOR T., Heigl, E., KÖNIG A. (2009): Erfassung der Gewässermakrophyten in Hessen. Untersuchung der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V. im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem Land Hessen.
- KOSEL, D. (2000): Beziehung zwischen Geotopen und Biotopen und ihre Aussagefähigkeit im Rheinland auf das Entwicklungspotenzial von Naturschutzgebieten. Diplomarbeit Uni Frankfurt Main. (Bsp. Kühkopf).
- KRETTEK, R. (2000): Zum Nahrungsspektrum hessischer Kormorane. - Vogel und Umwelt 11(1-2): 67-74.
- KREUZIGER, J. & E.L. ACHENBACH (1998) Graureiher (*Ardea cinerea*) verschlingt Küken des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*). - Vogelwarte 39: 301-302.
- KREUZIGER, J. & T. LANGENBERG (2000): Erste Überwinterung eines Eistauchers (*Gavia immer*) in Hessen. - Luscinia 56: XXX.
- KREUZIGER, J. & ZETTL, H. (1998): Die Auswirkung von Sukzessionsprozessen auf die Bestandentwicklung des Goldammers (*Emberiza citrinella*). - Collurio 16: 56-63.
- KREUZIGER, J. (1994): Die Vogelgemeinschaft einer Hartholzaue im NSG "Kühkopf-Knoblochsau". Ein Vergleich nach 15 Jahren. - Collurio 12: 9-38.
- KREUZIGER, J. (1995): Hohe Siedlungsdichte der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) im NSG „Kühkopf Knoblochsau“. - Collurio 13: 5-66.
- KREUZIGER, J. (1996): Die Bedeutung der Rheinauen für den Pirol (*Oriolus oriolus*). - Collurio 14: 42-46.
- KREUZIGER, J. (1997): Die Bedeutung von Sukzessions- und Renaturierungsprozessen für die Vogelgemeinschaft einer Flussaue (NSG „Kühkopf-Knoblochsau“, Nördliche Oberrheinniederung, Hessen) Dissertation an der TH Darmstadt, 79 S., Verbreitungskarten und Anhänge.
- KREUZIGER, J. (1997): Die Entwicklung der Brutvogelwelt des NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. - Collurio 15: 7-8
- KREUZIGER, J. (1997): Die aktuelle Situation des Buntspechts (*Dendrocopos major*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. (Kreis Groß-Gerau) als Folge waldbaulicher Maßnahmen. - Collurio 15: 29-36.
- KREUZIGER, J. (1998): Früheste Herbstbeobachtung des Rothkehlpiepers (*Anthus cervinus*) in Hessen. - Collurio 16: 66-68.
- KREUZIGER, J. (1998): Zur Bestandsentwicklung und Phänologie der größten hessischen Graureiherkolonie (*Ardea cinerea*) im Europareservat Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau). - Collurio 16: 47-55.
- KREUZIGER, J. (1998): Die Auswirkung großflächiger Renaturierungsprozesse auf die Brutvogelgemeinschaft einer Flussaue. - Vogelwelt 119(2): 65-90.
- KREUZIGER, J. (1998): Die Bedeutung von Sukzessions-Renaturierungsprozessen für die Vogelgemeinschaft einer Flussaue (NSG „Kühkopf-Knoblochsau“, Nördliche Oberrheinniederung, Hessen). - Journal für Ornithologie 139: 372-373.
- KREUZIGER, J. (1999): Brutkolonien des Komorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. - Vogel und Umwelt 10: 54-56.
- KREUZIGER, J. (1999): Der Baumpieper (*Anthus trivialis*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau - eines der letzten Refugien in Südhessen? - Collurio 17: 67-74.
- KREUZIGER, J. (1999): Starke Reduzierung forstwirtschaftlicher Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf die Spechte in einem der größten Auwaldgebiete Deutschlands (NSG Kühkopf-Knoblochsau, Kreis Groß-Gerau). Vogel und Umwelt 10: 21-38.
- KREUZIGER, J. (2000): Zum Auftreten der Kandagans (*Branta canadensis*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau). - Collurio 18: 81-86.
- KREUZIGER, J. (2001): "Heute hier - morgen dort": Bestandsentwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*) im NSG "Kühkopf-Knoblochsau" (Kreis Groß-Gerau). - Vogel und Umwelt 12(1): 33-45.
- KREUZIGER, J. (2001, i.E.): Die Entwicklung des Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau), mit einigen Anmerkungen zur überregionalen Bestandszunahme. - Luscini 56: XXX.
- KREUZIGER, J. (2002): Die Brutvogelwelt des NSG Kühkopf-Knoblochsau im Wandel der Zeit. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 50-56.

- KREUZIGER, J. (2008): Die aktuelle Situation im EU-Vogelschutzgebiet „Hessische Rheinauen mit Kühkopf-Knoblochsau. Collurio Nr. 26: 40-53
- KRISTAL, Ph. M. (1978): Schmetterlingsfauna des Kühkopf. - Die Naturschutzgebiete in Hessen, Darmstadt.
- KUHLKE, F. 2013: Vegetationsentwicklung nach einer Renaturierungsmaßnahme am Rhein im hessischen Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. Diplomarbeit am Institut für Geographie und Geologie Bereich WWF-Auen-Institut, Karlsruher Institut für Technologie: 86 Seiten
- LANDSCHULZE, I (2010).: Untersuchung einer natürlichen Verjüngungsfläche der Schwarzpappel (*Populus nigra* L.) im Uferbereich am Oberrhein bei Darmstadt. Bachelor-Arbeit, Philipps-Universität Marburg, Fachbereich Biologie: 38
- LEDESMA-KRIST, G. M.; NICK, P.; DAUMANN, J.; MAUL, E. & DISTER, E. (2013): Überlebenssicherung der Wildrebe *Vitis vinifera* L. ssp. *Sylvestris* C.C. Gmel. In den Rheinauen durch gezieltes in situ-Management. Abschlussbericht 2008-2013. 94 S. + Anhänge
- LELEK, A. (1978): Die Bedeutung der Altrheine für die Fischfauna des Rhein-Hauptstroms am Beispiel des Schusterwörther-Altrheins, Courier Forschungsinstitut Senckenberg 35.
- LIPPMANN, J. (1998): Stelzenläufer auf dem Kühkopf. – Collurio 16: 64-65.
- LÖTSCHERT, W. (1979): Die Pflanzenwelt des Kühkopfes und benachbarter Altrheingebiete. - In: Pfeifer (1971): 24-37.
- LÖTSCHERT, W. (1979): Die Pflanzenwelt des Kühkopfes und benachbarter Altrheingebiete - In: Pfeiffer (1979): 35-51.
- LUBIENSKI M. & BAUMGÄRTEL R. 2012: Der Erstnachweis der triploiden Schachtelhalmhybride *Equisetum x ascendens* Lubienski & Bennert (Equisetaceae) für Hessen. Botanik und Naturschutz in Hessen 25: 31–41.
- LUDEWIG K., DONATH T. W., ZELLE B., ECKSTEIN R. L., MOSNER E., OTTE A. & JENSEN K., Stand 07.05.2015, Effects of Reduced Summer Precipitation on Productivity and Forage Quality of Floodplain Meadows at the Elbe and the Rhine River
- LUDEWIG K., ZELLE B., ECKSTEIN R.L., MOSNER E., OTTE A. & DONATH T.W. 2014: Differential effects of reduced water potentials on the germination of floodplain grassland species indicative of wet and dry habitats. Seed Science Research 24: 49-60
- LUTZ, M.(2008): Zusammensetzung und räumliche Verteilung der Vegetation als Folge kleinräumiger Morphodynamik an einem unbefestigten Rheinufer um Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau. – Diplomarbeit im Studiengang Geoökologie der Universität Karlsruhe: 0-150
- MANGOLD, D. (2013): Analysen zur Ausbreitung des Uhus (*Bubo bubo*) in den Flussauen des Oberrheingrabens – Bachelorarbeit, Karlsruher Institut für Technologie: 52
- MANZKE, W. & WENTZEL, M. (2003): Zur Moosflora des Kühkopfes und der Knoblochsau (Nördliche Oberrheinniederung, Hessen): Die Moose der Kopfweiden. - Hessische Floristische Briefe 52: 40-61.
- MAYBERG, B.U. (1971): Die Besiedelung des NSG Kühkopf-Knoblochsau mit Greifvögeln im Jahre 1967. - In: Pfeiffer (1971): 107.
- MAYBERG, B.U. (1979): Die Siedlungsdichte der Greifvögel im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - In: Pfeiffer (1979): 157.
- MAYER, W. (1998): Das NSG Kühkopf-Knoblochsau - ein traditioneller Überwinterungsplatz der Saatgans (*Anser fabalis*) - Collurio 16, 36-46.
- MAYER, W. (2000): Brutbestand der Elster (*Pica pica*) im NSG Kühkopf-Knoblochsau und Umgebung. – Collurio 18: 35-36.
- MAYER, W. (2001): Wasserstandsabhängigkeit des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) in der Überflutungsau NSG Kühkopf-Knoblochsau (Kreis Groß-Gerau/Hessen). - Collurio 19: 1-10.
- MAYER, W., B. & R. TEETZ (1997): Bestandszunahme des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) im hessischen Ried. – Collurio 15: 19-24.
- MAYER, W. & ZETTL, H.: Artenliste zur Avifauna von Kühkopf-Knoblochsau, Stand 01.01.2003, Infozentrum Kühkopf-Knoblochsau.
- MECKE, T. (2002): Das Naturschutzgebiet im Spiegel der Administrationen -Was ist besser geworden? - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 18-21.

- MERKEL, F.W. (1979): Vom Tierleben des Kühkopfes und der Knoblochsau. - in: Peifer (1979): 52-95.
- MOROSCHAN, J.(2018): Landschaftsökologische Untersuchung der Flussinsel Kühkopf Veränderung der Kernflächen und Bezug zu Habitatpotenzialen. – Projektarbeit des Fachbereiches Agrarwissenschaften, Ökophologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen: 0-12
- MOSNER, E., HORCHLER, P. (2014): Auswirkungen des Klimawandels auf die Vegetation der Flussauen.Schlussbericht KLIWAS-Projekt 5.06. KLIWAS-53/2014. BfG, Koblenz. DOI: 10.5675/Kliwas_53/2014_5.06 URL: http://doi.bafg.de/KLIWAS/2014/Kliwas_53_2014_5.06.pdf
- MÜLLER, D. (2015): Der „Grüne Tisch“ - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 9 – 12
- NIETSCH, JÖRG (1989): Leben zwischen Wasser und Land. Das Naturschutzgebiet Kühkopf.Knoblochsau. - Nationalpark Nr. 62 1/98
- NOBIS, R. (1999): Vergleich des Einflusses unterschiedlicher Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Vegetation von vier Auenschutzprojekten in Nordwest-Europa mit Darstellung des Gesamtprojekts. - Diplomarbeit im Fach Landschaftsökologie der WWU Münster.
- PETERMANN, P., KREUZIGER, J. & FRIEMANN, H. (1995): 30 Jahre Wasservogelzählung im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. – Collurio 13: 5-66.
- PETERS, D. (1978): Ergebnisse der Vogelzählung am Schusterwörther-Altrhein, Courier Forschungsinstitut Senckenberg 35
- PFEIFER, S. (1934): Die Fischreier der Rheininsel Kühkopf. 10. Jahresbericht 1933-34
- PFEIFER,S. (1957): Starker Einflug der Dreizehnmöve im Winter 1956/57. - Lusc. 30: 24-25.
- PFEIFER, S. (Hrsg.) (1971): Das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, Frankfurt a.M.: A. Büchse u. E. Strobach.
- RECKER, U. (2015): Dynamik ist die einzige Konstante – Schutzkonzepte für die gewachsenen historischen Kulturlandschaften Hessens - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 27 – 31
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, Obere Naturschutzbehörde 1991: 3. Wanderführer Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau.
- REIF, A., BAUMGÄRTEL, R., DISTER, E., SCHNEIDER, E (2016).: Zur Natürlichkeit der Stieleiche (*Quercus robur* L.) in Flussauen Mitteleuropas – eine Fallstudie aus dem Naturschutzgebiet „Kühkopf-Knoblochsau“ am hessischen Oberrhein. - 15: 69-92. Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz: 69-92.
- REIF, A. & BAUMGÄRTEL, R. & DISTER, E. & SCHNEIDER, E. (2019): Natürliche Auendynamik ermöglicht Verjüngung der Stieleiche- Fallbeispiel NSG Kühkopf Knoblochsau in Hessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen Band 18: 96-101
- RENKER; C., WEITMANN, G. & GROH, K (2011).: Bericht über die 48. Jahrestagung der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft vom 29. Mai bis zum 1. Juni 2009 in Mainz. In Mitteilung der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, Heft 86: 25 –36
- ROTHENSTEIN, RITA (1999): Zur Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen, Diplomarbeit TU Berlin, unveröffentlicht.
- ROTHMANN, K. (1957): Der große Brachvogel als Brutvogel in Südhessen. - Lusc.30: 18-19.
- ROTHMANN, K. (1957): Beobachtungen an seltenen Entenvögeln in den Altrheingebieten. - Lusc. 30: 24-25.
- ROTHMANN, K. (1960): Weißflügelseeschwalbe am Erfelder Altrhein. - Lusc. 33: 44.
- ROTHMANN, K. (1960): Massenaufreten von Sommergoldhähnchen im Winter 1958/59 auf dem Kühkopf. - Lusc. 33: 47-48.
- SCHÄFER, W. (1973): Der Oberrhein, sterbende Landschaft? - Natur und Museum 103 (1).
- SCHÄFER, W. (1978): Der Oberrhein, ökotechnisch gesehen. Courir Forschungsinstitut Senckenberg 31.
- SCHÄFER, W. (Hrsg.) (1978): Ökologische Modelluntersuchungen „Schusterwörther Altrhein“, Courier Forschungsinstitut Senckenberg 35.
- SCHAFFRATH, U. (2011): Untersuchung der xylobionten Käferfauna im NSG Kühkopf-Knoblochsau Karlsruh und Rindswörth 2008 -2010. Studie im Auftrag der HGON: 132

- SCHINER, S. (1998): Raum-Zeit-Muster überwinternder Kormorane *Phalacrocorax carbo sinensis* am nördlichen Oberrhein (NSG Kühkopf-Knoblochsaue). - Vogel und Umwelt 9(5): 251-261.
- SCHMIDT, M. & MEYER, P. (2011): Hessische Naturwaldreservate im Portrait, Karlsruh. Herausgeber: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-VA), Landesbetrieb HESSEN-FORST: 39
- SCHMIEDE R., DONATH T.W. & OTTE A. 2009: Seed bank development after the restoration of alluvial grassland via transfer of seed-containing plant material. *Biological Conservation* 142: 158-167.
- SCHMIEDE, R. & HARNISCH, M. & OTTE, A. & DONATH, T. (2011): Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein-aktuelle Renaturierungsmaßnahmen und Perspektiven für ihre Erhaltung. *Collurio* Nr.28 (2010): 69-81
- SCHMIEDE R., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Artenanreicherung durch Mahdgutübertragung in artenarmen Grünland-beständen – welche Störungsintensität der Grasnarbe ist nötig? *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 115: 153-171
- SCHMIEDE R., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Enhancing plant biodiversity in species-poor grassland through plant material application – the impact of sward disturbance. *Applied Vegetation Science* 15: 290-298
- SCHMIEDE R., OTTE A. & DONATH T.W. 2012: Artenanreicherung durch Mahdgutübertragung in artenarmen Grünland-beständen – welche Störungsintensität der Grasnarbe ist nötig? *Naturschutz und Biologische Vielfalt* 115: 153-171
- SCHMIEDE R., RUPRECHT E., ECKSTEIN R.L., OTTE A. & DONATH T.W. 2013: Establishment of rare flood meadow species by plant material transfer: experimental tests of threshold amounts and the effect of sowing position. *Biological Conservation* 159: 222-229
- SCHNEIDER, E. (1995): Zur Vegetationsentwicklung auf den aufgelassenen Ackerflächen des Kühkopfs und das damit verbundene Auftreten seltener Arten. – *Collurio* 13: 67-78.
- SCHNEIDER, E. (2002): Vom Acker zur Auenwiese. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue, 44-50.
- SCHNELL, M. (2011): Untersuchungen zu Nahrungsgewohnheiten und Störreizen überwinternder Tundrasaatgänse (*Anser fabalis rossicus*) und Blessgänse (*Anser albifrons*) im Hessischen Ried mit der Ableitung von Handlungsempfehlungen für ein zukünftiges Gänsemanagement. Bachelorarbeit Hochschule RheinMain, Fachbereich Geisenheim, Studiengang Landschaftsarchitektur: 74
- SCHÖCKER, G. (2015): Das Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue - Denkmalpflege & Kulturgeschichte in Hessen, 3-2015: 3 - 9
- SCHRIMPF, A. (1979): Untersuchungen am Crustaceenplankton in den hessischen Naturschutzgebieten „Kühkopf-Knoblochsaue und „Lampertheimer Altrhein“, Zool. Institut der TH Darmstadt, unveröffentlicht.
- SCHULER, J. (2015): Baumbewohnende Ameisen mitteleuropäischer Auenwälder. Artenspektrum und Ökologie arborikoler Ameisen in naturnahen Hartholzauen an Rhein, Elbe und Donau. Zürich, Bristol-Stiftung; Bern, Haupt. 131.
- SINTERMANN, J. (2008): Sedimentationsinduzierte Nährstoffgradienten in Auenwiesen am hessischen Oberrhein. Diplomarbeit des Institut für Landschaftsökologie der Wilhelms-Universität Münster.
- STEIDL, M. (2018): Landschaftsstrukturanalyse im Naturschutzgebiet Kühkopf. – Projektarbeit des Fachbereiches Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen: 0-20
- STREHLOW, CARSTEN. 2013: Die Erfassung und Bewertung der Bedürfnisse von Erholungssuchenden für eine Verbesserung im NSG „Kühkopf-Knoblochsaue“, Bachelorarbeit Hochschule Geisenheim University, Studiengang Landschaftsarchitektur: 79 Seiten
- TRZASKA, J. (2007): Konzept für naturverträgliche Naherholung im südlichen Kreis Groß-Gerau. Überprüfung von Nutzungskonflikten in den Hessischen Rheinauen. Diplomarbeit der Universität Mainz; 171 Seiten.
- VALENTIN, K. 2008: Vegetations- und Nährstoffgradienten in Auenwiesen am nördlichen Oberrhein. Diplomarbeit des Institut für Landschaftsökologie der Wilhelms-Universität Münster.
- VIERTEL, B. (1980): Die Amphibien des hessischen Naturschutzgebietes Kühkopf-Knoblochsaue - *Natur und Museum* 110(1).
- VITZTHUM, A.L. (2019): Untersuchung der natürlichen Verjüngungspotentials der Hauptbaumarten im Bereich der Hartholzau unter der Berücksichtigung der Überflutungsempfindlichkeit und des Wildverbisses. – Masterarbeit im Studiengang Geoökologie des Karlsruher Instituts für Technologie: 0-105
- WAGNER, J. (2015): Natürlich Etablierung der Stieleiche (Q.r.L.) in der rezenten Aue des Oberrheins im Naturschutzgebiet Kühkopf, Hessen. Bachelorarbeit an der Albert-Ludwigs Universität Freiburg im Breisgau, Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen: 72 Seiten

- WEHNER, R. (1968): Von der Natürlichkeit der Natur (Bsp. Kühkopf). - Natur und Museum 98.
- WERNER, H. (1960): Rohrschwirl im hessischen Altrheingebiet. - Lusc. 32, 19-21.
- WINKEL, S. (1987): Der Einfluss des Überflutungsregimes auf die epigäische Anthropoden (Käfer) semiterrestrischer Standorte der Rheinaue (Kühkopf, Hessen), Diplomarbeit Biologie, Uni Frankfurt.
- WINKEL, S, FLÖSSER, E. 1985: Zusammenfassender Bericht über die tierökologischen Untersuchungen im NSG Kühkopf-Knoblochsau 1984/85. Unveröffentlichtes Gutachten:52
- WINTER S., JUNG L.S., ECKSTEIN R.L., OTTE A., DONATH T.W. & KRIECHBAUM M. 2014: Control of the toxic plant *Colchicum autumnale* in semi-natural grasslands: effects of cutting treatments on demography and diversity. *Journal of Applied Ecology* 51: 524-533.
- ZETTL, H. (1959): Purpurreiher auf dem Kühkopf. - Lusc. 32: 39.
- ZETTL, H. (1959): Rotfußfalke im NSG Kühkopf-Knoblochsau beobachtet - Lusc. 32: 30.
- ZETTL, H. und ROTHMANN, K. (1959): Beobachtungen an Limikolen in Südhessen. - Lusc. 32: 19-21.
- ZETTL, H. (1962): Über die Bestandszunahme der rheinischen Weidenmeise seit 1953 im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Lusc. 35: 41.
- ZETTL, H. (1962): Schwanzmeise als Bodenbrüter auf dem Kühkopf. - Lusc. 35: 41.
- ZETTL, H. (1962): Die große Rohrdommel als Durchzügler in den Brüderlöchern im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Lusc. 35: 27.
- ZETTL, H. (1963): Beobachtungen vom NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Mitt.O.A.O. 12: 27.
- ZETTL, H. (1963): Kann die Brutkolonie der Graureiher auf dem Kühkopf im NSG Kühkopf-Knoblochsau erhalten bleiben? - Mitt.O.A.O. 12: 25.
- ZETTL, H. et al. (1971): Die Vogelwelt des NSG Kühkopf; in Pfeifer 1979, 59-106.
- ZETTL, H. (1979): Die Vogelwelt des NSG Kühkopf. - in Pfeifer 1979, 105-150.
- ZETTL, H. (1995): Über die Entwicklung der Wälder im NSG Kühkopf-Knoblochsau. - Collurio 13: 79-84.
- ZETTL, H. (1995): Zu viel Wasser für die Aue Problemfall „Kühkopf-Knoblochsau“ - „Nationalpark“ 1/95.
- ZETTL, H. (1996): Das NSG Kühkopf-Knoblochsau – Veränderungen einer Rheinlandschaft. – Jahrbuch Naturschutz Hessen 1: 121-126.
- ZETTL, H. (2002): 50 Jahre Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsau". Ein Spaziergang durch Raum und Zeit. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 10-18.
- ZETTL, H. (2002): Greifvogeldichte als Weiser für Biotopqualität. - 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsau, 60-64.
- ZETTL, H. (2005): Die alten Rheinschlingen zwischen Gernsheim und Oppenheim. - Collurio 23, 126-132.
- ZETTL, H. (2007): Veränderungen in den hessischen Oberrheinauen – Eine Bestandsaufnahme rund um das NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. Collurio Nr. 25 (2007), 45 –51.
- ZETTL, H. (2008): Gelöste und ungelöste Probleme im NSG „Kühkopf-Knoblochsau“. Collurio Nr.26: 54-60.